



PADRES DE FAMILIA/TUTORES



LEA ANTES DEL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

Reglas de comer o beber antes de la cirugía, examen o tratamiento de su hijo



Comer o beber antes de la anestesia puede ocasionar problemas, como asfixia o vómitos. **Si usted no cumple estas reglas, la operación de su hijo podría ser cancelada.**



Tipo de alimento

Ejemplos

Hora en que el paciente puede comer o beber por última vez

Líquidos claros



Líquidos transparentes, como agua, jugo de manzana, Pedialyte, u otros jugos claros (sin pulpa), gelatina pura

2 horas antes de la hora que le indicaron que debe **llegar** al hospital



Lo último que beba no puede ser más de 1 taza (8 oz)

Leche materna



4 horas antes de la hora que le indicaron que debe **llegar** al hospital



TODOS los demás alimentos o líquidos

Sólidos, leche, fórmula, dulces, carne, pan, frituras, quesos, helados, mentas o chicle

A medianoche de la noche anterior a la cirugía



Déle a su hijo sus medicamentos habituales en la mañana del día de la cirugía. Las píldoras pueden tomarse con un trago de agua. Si tiene preguntas, haga favor de llamar a un anesthesiólogo al **410-955-7610**, de lunes a viernes de 9 AM a 4 PM.