



Instrucciones de alta para la adhesión labial

GENERAL

NO DEBE USAR EL CHUPETE POR TRES SEMANAS, ya que el uso puede dañar los puntos o la reparación.

ACTIVIDAD

En el momento de la cirugía se le darán férulas de velcro (conocidos como No-No's en inglés) que las debe usar todo el tiempo por las dos semanas siguientes a la cirugía., ya que es importante mantener los dedos y los juguetes lejos del labio y la boca. Aparte de esto, su niño puede retomar sus actividades normales.

DIETA

Después de la cirugía continúe el mismo método de alimentación que llevaba el niño antes de la cirugía. Le puede ofrecer una dieta suave, que incluya comida para bebé, licuada, o comidas machacadas con un tenedor. No debe ofrecerle caramelos duros, ni comidas crocantes como galletas, cereales secos o galletas de soda, ya que esto puede dañarla reparación.

EL CUIDADO DE LA HERIDA

La reparación del labio se cierra típicamente con suturas absorbibles y pegante quirúrgico. **Las suturas absorbibles y el pegamento quirúrgico** se deshacen lentamente a lo largo de un período de 10 a 14 días, frecuentemente con la apariencia costrosa o escamosa. Es posible que note las terminaciones o "puntas" de las suturas a lo largo de la incisión. **ES IMPORTANTE QUE NO** aplique ninguna crema tópica sobre la reparación, como el Cacitracin, el Neosporin, la vaselina ni ningún producto similar ya que estos pueden deshacer el pegante quirúrgico y/o las suturas absorbibles. Puede usar agua y jabón para limpiar el área de una manera segura.

MANEJO DEL DOLOR

Se espera que con el procedimiento, tenga dolor leve o moderado. Durante la hospitalización de su hijo/a, el equipo pediátrico para el dolor trabajará para asegurarse de que su hijo/a está cómodo. Cuando le den de alta, se le dará una receta oral para el dolor. Por seguridad la dosis del medicamento está basada en el peso del niño y debe proporcionársela como se le indicó.

VISITAS DE SEGUIMIENTO

Su hijo/a debe volver a la clínica para un seguimiento de rutina de dos a tres semanas después de la cirugía. Por favor llame al 410-955-9475 para cuadrar una cita posoperatoria.

INQUIETUDES/NÚMEROS DE CONTACTO

Llame al 410-955-9475 durante el horario de oficina para localizar al Dr. Richard Redett en caso de que tenga fiebre persistente (más de 101°F), que le supure o le sangre excesivamente, dificultad al respirar, dificultad al comer o que se rehúse a comer, llanto excesivo, o irritabilidad o que se queje de dolor. Kim Seifert, R.N. y Candie Marchand-Evans, PA-C típicamente se encuentran disponibles para revisar sus preguntas y dudas. Después del horario de oficina, llame 410-955-6070 y pida que le envíen un beeper al cirujano plástico de turno. Si tiene una emergencia, llame al 911.