



Instrucciones de alta de la reparación de labio leporino

GENERAL

NO SE DEBEN USAR CHUPETES POR TRES SEMANAS ya que estos pueden dañar los puntos o la reparación.

ACTIVIDAD

En el momento de la cirugía se pondrán férulas de velcro (NO-Nos), estas se deben mantener puestas **TODO EL TIEMPO** durante dos semanas después de la cirugía, ya que es importante mantener los dedos y los juguetes alejados de los labios y de la boca. Por lo demás su niño puede reanudar sus actividades normales.

DIETA

Después de la cirugía, continúe con el mismo método de alimentación que su niño/o estaba usando antes de la cirugía. Puede ofrecerle una dieta blanda incluyendo: comida para bebé, comidas licuadas o comidas machacadas con un tenedor. **NO** le dé caramelos ni comidas crocantes, tales como galletas o cereales secos ya que estos pueden dañar la reparación.

CUIDADO DE LA HERIDA

Usualmente la reparación se cierra con puntos no-absorbibles, puntos absorbibles o con pegante quirúrgico. Las suturas **no-absorbibles** se pueden limpiar cuidadosamente con agua y jabón después de la cirugía y típicamente se remueven en la sala de operaciones de cinco a siete días después de la cirugía. Las suturas **absorbibles y el pegante quirúrgico** se desbaratan lentamente en un periodo de 10 a 14 días y usualmente tienen una apariencia costrosa o escamosa. Posiblemente notará las puntas de las suturas a lo largo de la incisión, **ES IMPORTANTE QUE NO** aplique ninguna crema tópica como el Cacitracin, el Neosporin, la vaselina ni ningún producto similar ya que estos pueden deshacer el pegante quirúrgico y/o las suturas absorbibles. Puede usar agua y jabón para limpiar el área de una manera segura

MANEJO DEL DOLOR

Se espera que con el procedimiento, tenga dolor leve o moderado. Durante la hospitalización de su hijo/a, el equipo pediátrico para el dolor trabajará para asegurarse de que su hijo/a está cómodo. Cuando le den de alta, se le dará una receta oral para el dolor. Por seguridad la dosis del medicamento está basada en el peso del niño y debe proporcionársela como se le indicó.

CITAS DE SEGUIMIENTO

Su niño/a debe regresar a la clínica dos o tres semanas después de la cirugía para una cita de seguimiento de rutina. Para programar una cita post operatoria, por favor llame al 410-955-9475. Si se le puso un tubo nasal ("stent"), se le quitará cuando venga a la cita.

INQUIETUDES/NÚMEROS DE CONTACTO Llame al 410-955-9475 durante el horario de oficina para localizar al Dr. Richard Redett en caso de que tenga fiebre persistente (más de 101°F), que le supure o le sangre excesivamente, dificultad al respirar, dificultad al comer o que se rehúse a comer, llanto excesivo, o irritabilidad o que se queje de dolor. Kim Seifert, R.N. y Candie Marchand-Evans, PA-C típicamente se encuentran disponibles para revisar sus preguntas y dudas. Después del horario de oficina, llame 410-955-6070 y pida que le envíen un beeper al cirujano plástico de turno. Si tiene una emergencia, llame al 911.