



## Colgajo Faríngeo

### INDICACIONES PARA UN COLGAJO FARÍNCEO

A pesar de una reparaci3n adecuada del paladar, un n3mero peque1o de ni1os todav3a pueden tener dificultades con el habla. El paladar blando y los m3sculos de la faringe deber3an trabajar juntos para formar un sello, el cual separa la boca de la nariz. Esto previene que durante el habla el aire escape por la nariz. Usted puede haber notado que la voz de su ni1o (a) tiene una cualidad nasal, particularmente con los sonidos /p/ y /b/. Esto puede significar que el aire est3 escapando por la nariz durante el habla y que los m3sculos no est3n funcionando apropiadamente. Esto se llama insuficiencia velofaríngea, IVF (IVPI por sus siglas en ingl3s).

### ACERCA DE LA CIRUG3A

El colgajo faríngeo es un procedimiento quir3rgico para corregir o mejorar la cualidad del habla de su ni1o (a). Esto usualmente se hace entre los cuatro y seis a1os de edad. Para estrechar la apertura nasal, se transfiere el tejido muscular de la parte posterior de la garganta 3 faringe al paladar. Esto har3 posible que su ni1o(a) tenga una voz con un sonido m3s normal y que su habilidad para comunicarse aumente.

### DURACI3N DE LA CIRUG3A Y ESTAD3A EN EL HOSPITAL

La operaci3n usualmente toma aproximadamente dos horas. Las primeras 24 horas despu3s de la operaci3n, su ni1o (a) ser3 observado muy de cerca. Un tubo anaranjado en la nariz ayudar3 con la respiraci3n cuando ocurra la hinchaz3n. La hinchaz3n y la obstrucci3n nasal pueden causar algunos ronquidos. Esto es inc3modo pero desaparece paulatinamente. Su ni1o (a) estar3 en el hospital de uno a dos d3as.

### DURACI3N DE LA CIRUG3A Y ESTAD3A EN EL HOSPITAL

La operaci3n por lo general toma de dos a tres horas. Por lo general es necesario quedarse en el hospital por dos o tres d3as.

### MANEJO DEL DOLOR

Le puede dar los medicamentos para el dolor cada cuatro 3 seis horas, seg3n lo necesite. Le dar3n una receta.

### DIETA

Su ni1o (a) tendr3 un cat3ter intravenoso hasta que pueda tolerar l3quidos por la boca. Despu3s de esto, una dieta blanda por tres semanas es lo mejor. 3sta puede incluir: sopas, yogur, pur3 de frutas y vegetales, huevos revueltos, gelatina, helado pud3n, pur3 de papa o alimentos que han sido ablandados 3 licuados.

### NO USE PAJILLA

**POR TRES SEMANAS EVITE ALIMENTOS QUE PUEDAN RASPAR LA GARGANTA; tales como las frutas y vegetales crudos.**

### DESPU3S DE LA CIRUG3A

No hay ninguna restricci3n en la actividad f3sica. Su ni1o (a) puede regresar a la escuela cuando usted sienta que 3l o ella est3 listo (a). Su ni1o (a) puede roncar despu3s de la cirug3a, 3sto es normal, y generalmente mejora cuando la hinchaz3n disminuye. Usted puede notar una mejor3a en el habla durante la primera semana. La terapia del habla puede comenzar cuatro a seis semanas despu3s de la cirug3a.

### CITAS DE SEGUIMIENTO

Despu3s de la cirug3a llame al 443-997-9466 para hacer una cita en un d3a lunes, haga la cita aproximadamente para dos o tres semanas despu3s de la operaci3n. Esta cita ser3 seguida por una visita a la cl3nica de Paladar Hendido para evaluar los resultados despu3s de la cirug3a en seis u ocho semanas. En esta cita se determinar3 la necesidad de terapia para el habla. Llame al 443-997-9466 para hacer esta cita o para hablar de ello con Kim Seifert, R. N.

**NÚMEROS DE CONTACTO**

Durante horas de oficina, si usted nota sangrado significativo, temperatura persistente (más de 101 °F), o dificultad para respirar o comer, llame a su cirujano plástico. Para comunicarse con el Dr. Craig Vander Kolk llame al 410-955-2136. Para comunicarse con el Dr. Richard Redett llame al 410-955-9475. Después de horas de oficina llame al 410-955-6070 y pida que localicen al residente de cirugía plástica de turno.