

VÍRUS ZIKA

Para quem estiver planejando viajar para a **América Central ou do Sul ou para o Caribe**, evitar picadas de mosquitos é a melhor forma de evitar expor-se ao vírus Zika.

O vírus Zika é transmitido principalmente pela **PICADA DE MOSQUITOS INFECTADOS**.

DA MÃE PARA O BEBÊ E ATIVIDADE SEXUAL

Se uma gestante for picada por um mosquito infectado, a infecção pode atingir a placenta, infectando o feto também.

O vírus também pode ser transmitido sexualmente.

TRANSFUSÃO

O vírus também pode ser transmitido por transfusão de sangue ou exposição laboratorial.



1 a cada 5

PESSOAS AFETADAS APRESENTARÁ SINTOMAS.

Os sintomas do vírus Zika são geralmente leves. Pessoas infectadas com o vírus Zika raramente requerem hospitalização.



ERUPÇÕES CUTÂNEAS



DOR DE CABEÇA




FEBRE



COCEIRA NOS OLHOS

MELHOR FORMA DE PROTEGER-SE:

- Mulheres gestantes ou que estejam tentando engravidar devem considerar limitar suas viagens a países afetados por irrupções do vírus Zika.
- Quem estiver viajando a essas áreas deve seguir estes métodos de prevenção:



UTILIZAR SPRAY REPELENTE APROVADO PELA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



VESTIR CAMISAS DE MANGA LONGA E CALÇAS LONGAS



ficar em ambientes fechados

Para mais informações, visite <http://www.hopkinsmedicine.org/zika-virus/>



JOHNS HOPKINS
MEDICINE